

g3

Rendzina und Braune Rendzina aus Kalkstein des Oberen Muschelkalks, oft mit geringmächtigem Rest der Decklage**Verbreitet auftretende Böden**

Bodenformgruppe	g-R02	
Flächenanteil	60–80 %	
Nutzung	vorherrschend Acker, untergeordnet Grünland und Wald	
Relief	gewölbte und z. T. ausgedehnte flache Scheitelpunkte und Verebnungen sowie schwach bis mittel geneigte Hänge	
Bodentyp	Rendzina und Braune Rendzina	
Ausgangsmaterial	Kalkstein des Oberen Muschelkalks oft mit geringmächtigem Rest der Decklage	
Bodenartenprofil	Ut3–Lu–Tu3,Gr–fX2–5	1–3 dm
	^k;^k:l–t;Lu–T,fX6	
Karbonatführung	oft ab Bodenoberfläche; Waldböden und Braune Rendzinen unter LN z. T. mit karbonatfreiem Oberboden	
Gründigkeit	flach, stellenweise sehr flach	
Waldhumusform	typischer und moderartiger Mull, stellenweise mullartiger Moder	
Humusgehalt	Oberbod. LN	mittel humos, stellenweise schwach humos
	Unterboden	keine Angabe
Bodenreaktion	LN	schwach alkalisch bis neutral
	Wald	schwach alkalisch bis schwach sauer
Bodenschätzung	L5Vg, L6Vg, L7Vg, sL6Vg, LT5Vg, LT6Vg, LT7Vg, L6V, L5V, LT6V, LIIa3-, LIIa3-, LIIb3-, LIIb4-, LIIb5-, LIIc3-, LIIc4-	
Musterprofile	7119.205; 7517.5	

Begleitböden

untergeordnet Terra fusca-Rendzina aus steinigem, lehmig-tonigem Kalksteinersatz, z. T. mit geringmächtiger Decklage sowie, oft unter Wald, flach entwickelte Braunerde, Rendzina-Braunerde (g-B06, Kartiereinheit g27) und Braunerde-Rendzina aus Decklage über Kalkstein; vereinzelt Rendzina und Braune Rendzina auf Dolomitstein (g-R03, Kartiereinheit g4); ebenfalls vereinzelt, in exponierten Lagen, Kuppen und Hangversteilungen, sehr flach entwickelte Rendzina; in flachen Mulden, in ebenen Lagen und an schwach geneigten, gestreckten Hängen vereinzelt Terra fusca, Braunerde-Terra fusca (g-CF02, Kartiereinheit g53) und Terra fusca-Parabraunerde (g-L10, Kartiereinheit g44); in flachen Mulden und Hangfußlagen mittel tiefes oft kalkhaltiges Kolluvium (g-K09, Kartiereinheit g65)

Kennwerte

Feldkapazität	sehr gering (80–130 mm)
Nutzbare Feldkapazität	sehr gering bis gering (30–70 mm)
Luftkapazität	hoch
Wasserdurchlässigkeit	hoch bis sehr hoch
Sorptionskapazität	sehr gering bis gering (40–90 mol/z/m ²)
Erodierbarkeit	gering bis mittel

Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

Standort für naturnahe Vegetation	hoch	
Natürliche Bodenfruchtbarkeit	gering bis mittel (1.5)	
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	LN: gering bis mittel (1.5)	Wald: mittel bis hoch (2.5)
Filter und Puffer für Schadstoffe	LN: mittel (2.0)	Wald: mittel (2.0)
Gesamtbewertung	LN: 1.67	Wald: 2.00

Verbreitung und Besonderheiten

weit verbreitete Kartiereinheit im Gebiet des Oberen Muschelkalks (Heckengäu)