

t93a

Hoher Flächenanteil an Böden, die durch anthropogene Einflüsse gestört sind (Auftrag, Abbau, Terrassierung, Golfplätze, militärisch genutztes Gelände usw.); ursprünglich Auengley und Brauner Auenboden-Auengley aus Auenlehm

Verbreitet auftretende Böden

Bodenformgruppe	t-AG07a	
Flächenanteil	70–90 %	
Nutzung	Wald, LN	
Relief	ebene Talsohlen	
Bodentyp	hoher Flächenanteil an anthropogen veränderten Böden, ursprünglich Auengley und Brauner Auenboden-Auengley (Vega-Gley), beide vereinzelt pseudovergleyt	
Ausgangsmaterial	Auenlehm, z. T. über sandigen bis sandig-lehmigen Bachbettablagerungen	
Bodenartenprofil	Ls3–Uls–Tu3,G0–2(3)	6–>10 dm
	Su2–Ls2,G2–4	
Karbonatführung	karbonatfrei	
Gründigkeit	tief, Unterboden schlecht durchwurzelbar	
Waldhumusform	typischer und moderartiger Mull bis mullartiger Moder	
Humusgehalt	Oberbod. LN	mittel humos bis stark humos, stellenweise sehr stark humos
	Unterboden	sehr schwach humos bis mittel humos
Bodenreaktion	LN	sehr schwach sauer bis mittel sauer
	Wald	mittel sauer bis stark sauer
Bodenschätzung	LIIb2, LIIb2, LIIb3, LIIb3, LIIb4, TIb2, TIb3, TIb3	
Musterprofile	keine Angabe	

Begleitböden

vereinzelt Auengley über Niedermoor, Nassgley und Auengley-Brauner Auenboden; randlich stellenweise Gley-Kolluvium (t-K03, Kartiereinheit t78) oder Kolluvium-Gley (t-G01, Kartiereinheit t94)

Kennwerte

Feldkapazität	mittel bis hoch (280–420 mm)
Nutzbare Feldkapazität	hoch bis sehr hoch (160–220 mm)
Luftkapazität	mittel, im Unterboden gering bis hoch
Wasserdurchlässigkeit	gering bis mittel
Sorptionskapazität	mittel bis hoch (140–300 mol/z/m ²)
Erodierbarkeit	sehr gering bis mittel

Bodenfunktionen nach "Bodenschutz 23" (LUBW 2011)

Standort für naturnahe Vegetation	mittel bis hoch	
Natürliche Bodenfruchtbarkeit	mittel bis hoch (2.5)	
Ausgleichskörper im Wasserkreislauf	LN: mittel (2.0)	Wald: hoch (3.0)
Filter und Puffer für Schadstoffe	LN: mittel (2.0)	Wald: mittel (2.0)
Gesamtbewertung	LN: 2.17	Wald: 2.50

Verbreitung und Besonderheiten

Bachauen im Altmoränenhügelland